





Qu'est ce qu'une inflammation oculaire ?

L'inflammation est une réponse normale de l'organisme à une agression : traumatisme, infection, maladie auto-immune. Au niveau de l'œil elle peut faire des ravages parce qu'elle provoque notamment une rupture des barrières qui isolent l'œil de la circulation générale, permettant l'entrée dans l'œil de protéines et de cellules qui participent au processus inflammatoire et à la cicatrisation.



L'INFLAMMATION PEUT TOUCHER :

- la **cornée** (kératite) et la **sclère** (sclérite et épisclérite) à la surface de l'œil ;
- l'**uvé**e (uvéite) composée de l'iris, du corps ciliaire et de la choroïde ;
- par extension la **rétine** et la **papille** qui est le début du nerf optique.



INFLAM'ŒIL

Association Inflam'Œil
Maison des Associations du 15^e
BAL n° 43
22 rue de la Saïda
75015 PARIS



L'équipe d'Inflam'Œil
est à votre écoute !



09 72 12 09 13



contact@inflammoeil.org



www.inflammoeil.org




[/asso.inflammoeil](https://www.facebook.com/asso.inflammoeil)



[@inflammoeil](https://www.instagram.com/inflammoeil)

Inflam'Œil est membre de
Alliance Maladies Rares, Eurordis,
FAI2R et SENSGENE



INFLAM'ŒIL

Association loi 1901
reconnue d'intérêt général

Uvéite chez l'enfant

Mais à quoi sert cette Association ?



- **Information, soutien et orientation** des personnes atteintes d'inflammation oculaire et uvéite récidivantes, de leurs familles et aidants.
- **Sensibilisation et information** des professionnels de santé et du grand public.
- **Soutien à la recherche** médicale et scientifique.



Bulletin d'adhésion et de Soutien

Nom :

Prénom :

Âge :

Profession :

Adresse :

Tél :

Courriel :

Adhésion ou renouvellement 42€ ☐

Adhésion jeune -26 ans 30€ ☐

Don 10€ ☐ 20€ ☐ 30€ ☐ € ☐

Versements donnant droit à déduction fiscale.

☐ Je souhaite recevoir le bulletin
TYNDALL par courriel.

☐ J'accepte que mes coordonnées soient
transmises aux autres adhérents.

Date :

Signature :

Bulletin à découper et
à renvoyer à :
Association Inflamm'Œil
Maison des Associations du 15^e
BAL n° 43
22 rue de la Saïda, 75015 PARIS
(avec votre règlement par chèque ou
paiement en ligne
sur notre site « Nous aider »)



Les symptômes

Son œil peut être rouge, mais très souvent il est normal en apparence ; c'est l'attitude de votre enfant qui peut vous alerter :

- il craint la lumière
- il regarde la télévision de biais
- il se cache l'œil
- il évite le bord des trottoirs ou les murets
- il n'aime pas ou n'aime plus le vélo
- il est maladroit et ne voit pas le relief
- ses pupilles peuvent être asymétriques et/ou déformées
- il louche
- son iris change de couleur

L'enfant plus grand

- se plaint de mal voir
- d'avoir une sensation douloureuse à la lumière
- son niveau scolaire baisse
- ses pupilles sont asymétriques, resserrées ou déformées
- plus rarement son œil change de couleur

***Prenez ces symptômes au sérieux, l'avenir
visuel de votre enfant en dépend.***

Les Causes

Dans 30 à 50 % des cas, la cause est inconnue.

Causes connues les plus fréquentes :

- **Infections**
Par un virus, une bactérie, un parasite, un champignon
- **Maladies inflammatoires**
Oculaires, rhumatismales, intestinales, du système nerveux, vasculaires, générales
- **Traumatismes, chocs, chirurgie, corps étranger...**

Les risques

L'uvéïte peut apparaître rapidement avec un œil rouge et douloureux à la lumière, ou au contraire apparaître plus sournoisement.

Elle peut survenir à tout âge.

Le dépistage précoce est absolument nécessaire afin de :

- préserver la vision
- réduire les risques de complications (glaucome, œdème maculaire, cataracte, hémorragies voire décollement de la rétine...)

**Du suivi assidu et rigoureux du traitement
dépend la préservation du capital visuel de
votre enfant.**

Les traitements

La première démarche du médecin est d'éliminer les causes infectieuses de l'uvéïte. En cas d'infection, il prescrit des antibiotiques ou antiviraux associés ou non à des corticoïdes en fonction de l'intensité de l'inflammation.

Les collyres prescrits maintiennent la pupille dilatée et sont anti-inflammatoires.

Selon le diagnostic, plusieurs médicaments peuvent être employés pour calmer l'inflammation :

Des corticoïdes prescrits sous forme de collyres, de pommades et/ou en injection locale. Ils peuvent également être administrés par perfusion (bolus) et/ou par comprimés.

(Toute corticothérapie initialement à forte dose nécessite de suivre un régime alimentaire peu chargé en sucres rapides et en sel, très présents dans notre alimentation industrialisée. Un apport de potassium, de calcium et de vitamine D est également associé au traitement).

Un immunosuppresseur ou un immunomodulateur pourra être prescrit en première intention ou associé aux corticoïdes (méthotrexate, anti-TNFα, interféron...).